

تعليمات تناول الدواء بيكوبريب®



الموعد المحدد لك لتنظيف القولون

-1

اسم العائلة	التاريخ
<input type="text"/>	<input type="text"/>
الوقت	الطبيب
<input type="text"/>	<input type="text"/>
الاسم الشخصي	
<input type="text"/>	

الكيس الثاني من بيكوبريب®

بتاريخ

في تمام الساعة


الكيس الأول من بيكوبريب®

بتاريخ

في تمام الساعة

ما هي طريقة تناول بيكوبريب®؟

-2



٥- بعد تناول المحتويات المذابة للكيس الثاني، اشرب على الأقل ٣ مرات ٢٥٠ مليلتر من أي سائل صافٍ موزعة على عدة ساعات.

٤- اشرب محتويات الكيس الأول المذابة. ثم اشرب بعد ذلك على الأقل ٥ مرات ٢٥٠ مليلتر من أي سائل صافٍ موزعة على عدة ساعات.

٣- قَلِّب المزيج لمدة من دقيقتين إلى ٣ دقائق. عندما يصبح المحلول ساخنًا انتظر بعض الوقت حتى يبرد بالقدر الكافي.

٢- أفرغ محتويات الكيس في الكوب.

١- املا كوب بـ ١٥٠ مليلتر من الماء.

أدوية إضافية

-3

تم تناول بتاريخ	في تمام الساعة
<input type="text"/>	<input type="text" value="صباحًا/مساءً"/>
تم تناول بتاريخ	في تمام الساعة
<input type="text"/>	<input type="text" value="صباحًا/مساءً"/>

تعليمات تناول الدواء بيكوبريب®



تناول الكيس الثاني

الوقت

التاريخ

بعد تناول الكيس الثاني يرجى شرب
من أي سائل صافٍ من اختيارك.
لتر على الأقل إجمالاً

يرجى التوقف عن الشرب بعد الساعة

تتم عملية تنظيف الأمعاء بنجاح عند إخراجك لسائل
صافٍ فقط بدون أية مكونات صلبة.



كمية سائل الشرب بالمليتر

الوقت

إجمالي كمية سائل الشرب

التوقيع

تناول الكيس الأول

الوقت

التاريخ

بعد تناول الكيس الأول يرجى شرب
من أي سائل صافٍ من اختيارك.
لتر على الأقل إجمالاً

قواعد شرب السوائل

كمية سائل الشرب بالمليتر

الوقت

إجمالي كمية سائل الشرب

حوالي ١٥٠ مليلتر



حوالي ٢٠٠ مليلتر



حوالي ٢٥٠ مليلتر

